

Intervencionismo no coronario en hospital comarcal: resultados asistenciales

Miguel Angel Montilla Garrido(1), Angie Tatiana Ariza Mosquera(1), Manuel García del Río(1), María Arjona Arjona(1) y Gerardo Nau(1) de (1)Cardiología. Hospital Punta de Europa, Algeciras (Cádiz) - España

Introducción: Uno de los mayores avances en la cardiología intervencionista ha sido el desarrollo de procedimientos estructurales y no coronarios. A pesar de los buenos resultados de eficacia, y especialmente de seguridad, estos procedimientos se centralizan generalmente en centros de 2º y 3º nivel. En este estudio presentamos los resultados de eficacia y seguridad de los procedimientos no coronarios realizados en nuestro centro, un hospital comarcal.

Métodos: Realizamos un análisis descriptivo retrospectivo de los pacientes sometidos a intervencionismo percutáneo no coronario en nuestro centro. Se evaluaron características clínicas, técnicas y complicaciones en el seguimiento.

Resultados: Desde enero 2024 a Abril de 2026 se analizaron un total 19 pacientes con edad media de 57 años, el 47.4% mujeres (n=9). Presentaban HTA el 47.4% (n=9), dislipemia el 52.6% (n=10), tabaquismo el 26.3% (n=5), diabetes el 15.8% (n=3), fibrilación auricular 42.1% (n=8), cardiopatía isquémica el 10.5% (n=2) y enfermedad renal crónica (ERC) el 5.3% (n=1).
Respecto a los procedimientos se realizaron cierre de FOP en el 31.6% (n=6) de los casos, cierre de CIA en el 26.3% (n=5), denervación renal en el 21.1% (n=4), cierre de orejuela izquierda en el 15.8% (n=3) y un caso de implante de Reducer. Se empleó principalmente el acceso venoso femoral 73.7% (n=14) así como arteria femoral en el 21.1% (n=4) y un caso de acceso venoso yugular (5.3%). Se empleó anestesia en 89.5% (n=17) de los casos con un 100% de éxito del procedimiento.
No se registraron complicaciones periprocedimiento salvo un caso de IAM periprocedimiento (5.3%) y un episodio de sangrado menor (5.3%) . En el seguimiento a largo plazo no se registraron eventos adversos.

Conclusiones: Los procedimientos realizados en nuestro centro mostraron una alta tasa de éxito con baja tasa de complicaciones.